

OGGETTO: RICHIAMO CONTRO DIFTERITE, TETANO, PERTOSSE, POLIO, E MORBILLO, PAROTITE, ROSOLIA E VARICELLA ALL'ETÀ DI 5 ANNI

La vaccinazione di richiamo difterite tetano pertosse polio (DTPa-Polio) prolunga la protezione individuale già ottenuta con le vaccinazioni precedenti, poiché essa diminuisce con il passare degli anni, mentre il richiamo contro morbillo parotite rosolia varicella (MPR-V) costituisce il completamento del ciclo vaccinale, iniziato al 13 mese di vita con la prima dose.

Possibili reazioni alla vaccinazione DTPa-Polio sono: rossore, gonfiore, dolore nella sede di iniezione, più raramente febbre, mentre per il MPR-V dal 6° al 14° giorno dalla somministrazione del vaccino possono comparire, febbre (talvolta elevata), eruzione cutanea (puntini rossi sulla pelle), dolori articolari, ingrossamento delle parotidi (ghiandole ai lati del viso) e dei linfonodi del collo. Queste manifestazioni non sono contagiose e si risolvono spontaneamente nel giro di qualche giorno con la terapia antipiretica. Molto più rara è la comparsa di numerosi puntini rossi o ecchimosi non giustificate da traumi nei 2 mesi successivi alla vaccinazione: è un calo transitorio delle piastrine. In questo caso è necessario parlarne al medico curante. Il vaccino della varicella può raramente determinare la comparsa di vescicole simili a quelle della malattia. Si raccomanda a donne in gravidanza e soggetti immunodepressi di evitare il contatto diretto con tali vescicole.

L'uso di salicilati (es. Aspirina) deve essere evitato per le 6 settimane successive alla vaccinazione antivariocella.

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi al pediatra/medico curante di vostro figlio oppure al personale della pediatria di comunità.